

Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à solliciter
notre personnel soignant et les équipes
de prévention et contrôle des infections !

EpiCURA
mon hôpital

Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Editeur responsable : François Burhin - Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

Ne pas jeter sur la voie publique - Novembre 2021.



L'isolement air

EpiCURA
mon hôpital

Pourquoi isoler les patients à l'hôpital ?

L'hôpital rassemble un grand nombre de personnes souvent très malades et fragiles au même endroit. Il y a de nombreux contacts physiques ou une certaine proximité entre les patients et avec les soignants. Lorsque le risque de transmission est important, le personnel au contact de ces patients doit prendre des mesures particulières.

Ces mesures aident à éviter la dispersion de germes dans l'hôpital et à réduire le risque d'épidémie survenant plus facilement dans les collectivités.

Pourquoi appelle-t-on cela un isolement air ?

Les particules infectieuses de très petite taille émises par une personne infectée restent un certain temps en suspension dans l'air. C'est à ce moment que la transmission de la maladie peut avoir lieu. Ces particules sont produites en toussant, en éternuant ou en parlant.

Elles peuvent se disséminer sur de longues distances et être remises en suspension en cas de courants d'air (laisser la porte ouverte, etc) ou d'action sur l'environnement (déplacement d'objets, etc).

L'isolement air est-il parfois combiné à d'autres types d'isolement ?

L'isolement air est parfois combiné à d'autres types d'isolement. En effet, les bactéries et virus utilisent un mode de transmission principal (contact, gouttelettes ou air), mais peuvent parfois en utiliser un deuxième. Une information est disponible pour chaque mode de transmission, n'hésitez pas à la demander au personnel soignant.

Que faire en cas de (ré)hospitalisation ?

Dès votre admission, informez le personnel soignant de votre antécédent d'isolement. La bactérie concernée sera recherchée lors d'exams médicaux. En attendant les résultats, vous serez placé(e) en isolement en fonction de votre contagiosité. Si la bactérie est détectée, ces mesures d'isolement seront maintenues.

Précautions à prendre

À L'HÔPITAL

- Suivez les consignes d'isolement indiquées sur la porte du patient (port de gants ou de blouse, lavage des mains,...).
- Portez un masque adapté. Celui-ci sera différent si vous êtes le patient en isolement (masque médical) ou le visiteur (masque FFP2).
- Utilisez le gel hydroalcoolique mis à disposition à l'hôpital pour l'hygiène des mains. N'hésitez pas à répéter ce geste régulièrement.

À LA MAISON

- Selon les instructions données par votre médecin ou l'équipe vous prenant en charge à l'hôpital, portez un masque médical en présence d'autres personnes.
- Aérez fréquemment les espaces de vie.
- Évitez les contacts avec les personnes fragiles, âgées, immunodéprimées, femmes enceintes et avec les jeunes enfants.
- Pratiquez le lavage des mains à l'eau et au savon liquide si les mains sont sales, après être allé(e) aux toilettes, avant de préparer les repas, avant et après avoir mangé, après vous être mouché ou après avoir éternué ou toussé.
- Toussez ou éternuez dans un mouchoir à usage unique et non dans vos mains ou sur d'autres personnes. Si vous n'en disposez pas, faites-le dans le coude ou l'épaule.

