

Contact

Le personnel soignant reste à votre disposition pour toute question complémentaire.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : fonctionalgologique@epicura.be

Ne pas jeter sur la voie publique - Décembre 2020.

Traitement de la douleur

Perfusion de Pamidronate

EpiCURA
mon hôpital

Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Editeur responsable : François Burhin - Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

EpiCURA
mon hôpital

Vous souffrez d'une maladie qui touche les os comme l'ostéoporose, certaines métastases osseuses, ou d'un syndrome douloureux comme l'algodystrophie ? Pour diminuer ces douleurs, votre médecin vous a prescrit une ou plusieurs injections de pamidronate.

Comment se passe le traitement ?

Le pamidronate renforce le tissu osseux, soulage les douleurs et prévient divers troubles comme les fractures. Il vous sera administré par perfusion intraveineuse lente durant quatre à six heures.

Après la perfusion, il se peut que vous ne ressentiez aucune amélioration. Chez certains patients, un délai d'une quinzaine de jours est parfois nécessaire pour ressentir un soulagement. L'effet bénéfique peut être temporaire et nécessiter des perfusions supplémentaires.

AVANT LA PERFUSION

- Passez un examen dentaire complet avant de commencer ce traitement. Veillez à programmer vos interventions dentaires avant le début du traitement. En effet, vous ne devez pas subir de chirurgie ou de traitement dentaire invasif pendant le traitement et ce, jusqu'à six semaines après.
- Ne prenez pas le pamidronate simultanément avec d'autres médicaments destinés à augmenter votre concentration de calcium.
- Ne prenez pas de pamidronate si vous souffrez d'un trouble rénal ou d'une hypertension artérielle sévère et mal contrôlée. Prévenez votre médecin si vous êtes sujet·te à l'une de ces pathologies. Pendant votre traitement, votre médecin vérifiera la fonction de vos reins fréquemment pour s'assurer que ce médicament vous convient.
- Après l'administration d'une série de perfusions, votre médecin pourra vous recommander de prendre du calcium et de la vitamine D. Ne prenez pas d'autre supplément de votre propre initiative.

Attention, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous ne devriez pas recevoir ce traitement.

Veillez à maintenir une bonne hygiène buccale durant le traitement. Assurez-vous que vos prothèses dentaires sont bien ajustées et retirez-les la nuit.

Effets indésirables éventuels

Les plus courants

- Crampes abdominales
- Spasmes musculaires
- Nausées
- Douleurs et gonflement à l'endroit de l'injection
- Maux de gorge
- Douleurs articulaires et musculaires

La plupart des patients décrivent cet état transitoire comme un syndrome grippal. Vous pouvez prendre un comprimé de paracétamol (1 g.) au besoin. Un anti-inflammatoire (par exemple de l'ibuprofène) vous sera également prescrit si nécessaire.

Moins courants

- Rigidité musculaire
- Modification de la fonction rénale

Rares

- Douleurs
- Gonflement
- Infection des gencives
- Déchaussement des dents
- Lourdeur de la mâchoire

L'apparition d'une douleur prolongée dans votre mâchoire inférieure doit vous faire consulter votre médecin rapidement.