



# EpiCURA

mon hôpital

## INFORMATION SUR LA VACCINATION CONTRE LA COQUELUCHE POUR LES PERSONNES EN CONTACT AVEC DES NOURRISSONS

**La coqueluche est une maladie très contagieuse, grave et parfois mortelle. De jeunes parents non immunisés peuvent la transmettre à leur bébé. Les nourrissons qui vivent entourés d'adultes vaccinés ont moins de risque de contracter la coqueluche. C'est pour cette raison que la vaccination est recommandée pendant la grossesse.**

### **Pourquoi parler de la coqueluche maintenant ?**

Depuis quelques années, le nombre de cas de coqueluche augmente. Les bébés non vaccinés ou protégés partiellement sont les plus touchés.

### **La coqueluche est-elle une maladie facile à attraper ?**

**OUI.** La coqueluche est une maladie très contagieuse causée par une bactérie appelée le bacille coquelucheux. Il se transmet par les postillons de la salive émis lorsqu'on parle, tousse ou éternue. De jeunes parents non immunisés peuvent être malade sans s'en rendre compte et la transmettre à leur bébé.

### **Quels sont les symptômes chez l'enfant ?**

Cette maladie se caractérise par de violentes quintes de toux pouvant entraîner des difficultés respiratoires et des vomissements. L'enfant atteint reprend sa respiration par une longue inspiration qui rappelle le « chant du coq ».

### **La coqueluche est-elle une maladie grave ?**

**OUI.** La coqueluche est une maladie grave chez les bébés. Avant l'âge de 6 mois, elle peut être mortelle car les quintes de toux peuvent provoquer des arrêts respiratoires ou cardiaques.

### **Comment protéger mon enfant ?**

Les nourrissons entourés d'adultes bien vaccinés sont mieux protégés.

Nous recommandons dès lors la vaccination :

- aux adultes (vaccination "cocoon", voir ci-dessous),
- aux nourrissons (dès l'âge de 2 mois),
- aux enfants (rappel à 5-6 ans et entre 14 et 16 ans).

### **Qu'est-ce que la vaccination « cocoon » ?**

Il s'agit d'administrer de préférence quelques semaines avant l'accouchement (au plus tard immédiatement après l'accouchement) une seule dose de rappel à toute personne en contact avec les nourrissons. Elle concerne les futurs parents, les proches du bébé, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants, les professionnels de la petite enfance et de la santé. Pour les femmes enceintes, la vaccination se fait idéalement entre la 24ème et la 32ème semaine de grossesse, même si un vaccin de rappel a déjà été fait.

### **La vaccination est-elle sûre durant la grossesse ou l'allaitement ?**

**OUI.** Une femme enceinte peut être vaccinée après le 1<sup>er</sup> trimestre et l'allaitement n'empêche pas la vaccination.

**Le vaccin contre la coqueluche protège aussi contre le tétanos et la diphtérie.**

Cette brochure est écrite selon les règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre : Inclusion Europe. Plus d'informations sur les sites FALC.be et unapei.org



**EpiCURA**  
mon hôpital

Centre Hospitalier EpiCURA asbl  
Siège social :  
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

**T. : 078 / 150 170**  
**www.epicura.be**

